



PIANO TRATTAMENTO INDIVIDUALE DELLO STUDENTE/STUDENTESSA CON EPILESSIA

(a cura dello specialista)

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Vista la richiesta dei genitori e constatata l'assoluta necessità

SI PRESCRIVE LA SOMMINISTRAZIONE IN ORARIO SCOLASTICO, DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO, DEI FARMACI SOTTOINDICATI ALLO STUDENTE/STUDENTESSA

Cognome

Nome

Data di nascita

Diagnosi per cui può essere richiesto un intervento di emergenza:

Scuola: ITE TAMBOSI Classe:

Padre

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Tel. Casa:

Tel. Lavoro:

Tel. Cellulare:



Madre

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Tel. Casa:

Tel. Lavoro:

Tel. Cellulare:

Altri numeri da contattare in caso di emergenza:

1. Nome:

Cognome:

Relazione con lo studente/studentessa:

Tel.:

Cellulare:

2. Nome:

Cognome:

Relazione con lo studente/studentessa:

Tel.:



Istituto Tecnico Economico

TAMBOSI
Trento



Repubblica
Italiana



Provincia Autonoma
di Trento

Via Brigata Acqui, 19 - 38122 Trento - Tel. 0461/239955 - CF 80016420228
E-mail: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it

Cellulare:

Medico curante:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Tel.:

Cellulare:

Farmaci per la continuità terapeutica

Farmaco:

Nome commerciale:

Principio attivo:

Dose:

Quante volte:

Come:

Presidi da utilizzare:

Modalità conservazione:

Note

Data

Timbro e firma del Medico



Somministrazione di Diazepam

Si certifica che lo studente/ssa , nato/a il

ha diagnosi di

In caso di crisi convulsiva si consiglia di porre il/la studente/ssa in posizione di sicurezza su di un fianco e, nel caso in cui la crisi si prolunghi oltre i minuti, si dà indicazione alla somministrazione di Micropam (microclisma)

(specificare la dose) per via endorettale

Il farmaco si può conservare in frigorifero o a temperatura ambiente, purché lontano da fonti di calore.

Si dichiara, inoltre, che si tratta di un farmaco che può essere somministrato da personale non sanitario adeguatamente formato, di cui si autorizza fin d'ora l'intervento.

Si rilascia per gli usi consentiti

Data

Dott.



Somministrazione di Midazolam

Si certifica che lo studente/ssa

nato/a il ha diagnosi di

In caso di crisi convulsiva si consiglia di porre il paziente in posizione di sicurezza su di un fianco e, nel caso in cui la crisi si prolunghi oltre i cinque minuti, si dà indicazione alla somministrazione di Buccolam© (specificare la dose) oro-mucosale.

L'intera quantità deve essere inserita lentamente nello spazio tra la gengiva e la guancia metà dose da un lato e metà dall'altro.

Se la crisi non cessa entro 1 minuto dalla somministrazione di midazolam, deve essere richiesta assistenza medica d'emergenza e la siringa vuota deve essere consegnata all'operatore sanitario, per fornire informazioni sulla dose ricevuta dal paziente.

Quando le crisi si ripresentano dopo una risposta iniziale, una seconda dose o una dose ripetuta non deve essere somministrata senza consultare prima il medico.

Il farmaco si può conservare a temperatura ambiente, purché lontano da fonti di calore.

Si dichiara, inoltre, che si tratta di un farmaco che può essere somministrato da personale non sanitario adeguatamente formato, di cui si autorizza fin d'ora l'intervento. La somministrazione del farmaco è ripetibile a breve distanza da precedente somministrazione in caso della persistenza di crisi convulsiva SOLO da personale medico specializzato.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



Istituto Tecnico Economico

TAMBOSI
Trento



Repubblica
Italiana



Provincia Autonoma
di Trento

Via Brigata Acqui, 19 - 38122 Trento - Tel. 0461/239955 - CF 80016420228
E-mail: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it

Data

Dott.